

ОБРАБОТКА ЭКСПРЕССИРОВАННОГО ГРУДНОГО МОЛОКА

В идеале вы должны сцеживать грудное молоко примерно каждые 3 часа (в соответствии с ритмом вашего ребенка), чтобы стимулировать и поддерживать выработку молока. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к консультанту по грудному вскармливанию на G1, вашей акушерке или медсестре.



Если вы сцеживаете грудное молоко в домашних условиях, важно, чтобы после этого оно постоянно хранилось в холодильнике.

Чтобы не прерывать холодовую цепочку, по дороге в больницу грудное молоко следует хранить в прохладной сумке с охлаждающими пакетами.

Пожалуйста, наклейте на бутылочки этикетки с именем ребенка, датой и временем сцеживания.



Когда вы придете, на входе рядом с халатами вы найдете стол с корзинами. Пожалуйста, протрите внешнюю поверхность бутылок дезинфицирующими салфетками, которые прилагаются, а затем положите их в одну из корзин.



Затем вы можете взять корзину с собой и поставить ее на специально отведенный стол в коридоре перед служебным помещением.

Мы сразу же перельем молоко в бутылки, подготовим его к приему пищи и охладим.

Важно: По гигиеническим соображениям разрешается использовать грудное молоко только в течение 24 часов с момента сцеживания. Нельзя сцеживать грудное молоко, полученное в разное время.



После посещения вы можете снова забрать свои бутылочки домой и очистить бутылочки, подлежащие возврату, в соответствии с инструкциями производителя.

Ваша команда КЗ 😊